

Lea las siguientes instrucciones atentamente al menos 7 días antes del procedimiento que tiene programado. Es absolutamente necesario que respete las siguientes instrucciones, sin realizar cambios, a menos que lo especifique su médico.

CRONOGRAMA	Lo que USTED necesita hacer	Comentarios
<p>Siete días antes del procedimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evite TODAS las nueces, semillas, maíz y verduras de hoja verde CRUDAS. ▪ Acuerde con un adulto responsable para que lo lleve hasta las instalaciones el día de su procedimiento. ▪ SI UTILIZA PRODUCTOS ANTICOAGULANTES: Siga las instrucciones para su producto anticoagulante según le indicó su médico gastroenterólogo, cardiólogo o el médico que emite las recetas. ▪ SI TOMA PRODUCTOS CON INSULINA O PÍLDORAS ORALES PARA LA DIABETES: Comuníquese con su médico para obtener instrucciones específicas con respecto a las dosis del día anterior y el mismo día de su procedimiento. 	<p>Necesitará que un adulto responsable lo lleve a su casa después del procedimiento. Es la política del centro cancelar el procedimiento si no hay alguien que lo lleve a su casa.</p>
<p>Cinco días antes del procedimiento (o tan pronto como se le ordene)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vaya a la farmacia y recoja el preparado de SUTAB que le recetaron 	
<p>Un día antes del procedimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DESAYUNO: deberá tomar un desayuno liviano. Esto DEBE finalizar para las 9:00 a. m. ▪ Elija UNA de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pan blanco/tostada O ○ Cereal de arroz O ○ Crema de trigo O ○ Huevos ▪ También puede desayunar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ○ Leche ○ Jugo (no de color rojo, ni azul, ni morado) ▪ Después de las 9:00 a. m. y hasta DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO, no coma ni beba nada más que líquidos claros (ni rojos, ni azules, ni púrpura). Los líquidos claros incluyen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua y té ▪ Café puro, sin crema ni leche ▪ Jugos de color claro como de manzana o uva blanca ▪ Limonada de mezcla en polvo ▪ Kool Aid o Crystal Light ▪ Sodas claras (7-Up, Sprite, Ginger Ale) ▪ Gatorade/PowerAde ▪ Consomé/caldo/sopa sin grasa ▪ Gelatina saborizada/natural (sin fruta agregada) ▪ Helados italianos, sorbetes, paletas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EL DESAYUNO DEBE ESTAR COMPLETO PARA LAS 9:00 A. M. ▪ LÍQUIDOS CLAROS SOLO DESPUÉS DE LAS 9:00 A. M.

VER AL DORSO PARA OBTENER INSTRUCCIONES ADICIONALES ACERCA DEL PREPARADO

CRONOGRAMA	Lo que USTED necesita hacer	Comentarios
<p>Un día antes del procedimiento a las 4:00 p. m.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comience con la primera dosis del preparado <ol style="list-style-type: none"> 1. Abra 1 botella de 12 tabletas. Llene el recipiente que se le proporcionó con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado). 2. Trague cada tableta con un trago de agua cada 15-30 minutos y beba toda el agua. 3. Una hora después de haber ingerido la última tableta, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua y beba todo el contenido en 30 minutos. 4. 30 minutos después de terminar el segundo recipiente de agua, vuelva a llenar el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua y beba todo el contenido en 30 minutos. 5. Continúe bebiendo líquidos claros durante el resto de la tarde. 	<p>Es muy importante que beba el agua indicada en los pasos 2 a 4.</p> <p>Permanezca cerca del baño. Puede utilizar toallas húmedas para bebés o un ungüento A&D para aliviar las molestias causadas por los resultados del preparado.</p>
<p>DÍA DEL PROCEDIMIENTO: SIETE horas antes del horario de ingreso</p> <p>(Por ejemplo, si va a ingresar a las 7:15 a. m., será necesario que se levante a las 12:15 a. m. y comience a beber la 2º botella de tabletas).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Debe tomar los medicamentos según le hayan indicado (especialmente los del corazón y presión sanguínea) hasta 4 horas antes de ingresar para realizar el procedimiento. ▪ Repita los pasos de 1 a 4 anteriormente mencionados para la segunda dosis utilizando la 2º botella de 12 tabletas. ▪ Siga las instrucciones específicas brindadas por su médico con respecto a la insulina, las píldoras orales para la diabetes y los anticoagulantes. ▪ Después de eso, deje de beber líquidos. ▪ No consuma nada por boca, incluidas la goma de mascar, las mentas y dulces comenzando 4 horas antes de que se haya completado el procedimiento. 	<p>NO tome ningún medicamento después de completar su 2º dosis del preparado.</p> <p>Las evacuaciones se tornarón acuosas y hacia el final de la preparación aparecerán amarillas o claras. Si las evacuaciones no son AMARILLAS NI CLARAS, notifique al enfermero a cargo de los preparativos cuando llegue a las instalaciones.</p>
<p>Hora de la cita</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Llegue a la hora de su cita con el conductor adulto responsable (ver página 1). 	<p>Por su seguridad, se cancelará el procedimiento si no ha arreglado quien lo lleve a su casa.</p>

Instalaciones para la endoscopia

Harmony Surgery Center

2127 E Harmony Road
Suite 200
Fort Collins, CO 80528
Teléfono: (970) 297-6300

Poudre Valley Hospital

1024 S Lemay Ave
Fort Collins, CO 80524
Teléfono: (970) 495-7000

McKee Medical Center

2000 N Boise Ave
Loveland, CO 80538
Teléfono: (970) 820-4640

Greeley Endoscopy Center

8227 W. 20th Street
Greeley, CO 80634
Teléfono: (970) 573-7555

Medical Center of the Rockies

2500 Rocky Mountain Ave
Loveland, CO 80538
Teléfono: (970) 624-2500

Estes Park Medical Center

555 Prospect Ave
Estes Park, CO 80517
Teléfono: (970) 586-2317

Skyline Endoscopy Center

2555 E 13th Street
Suite 210
Loveland, CO 80537
Teléfono: (970) 663-2159

Greeley Hospital

6767 W 29th Street
Greeley, CO 80634
Teléfono: (970) 652-2000